

Dysplazie loketního kloubu

U Vašeho pejska bylo zjištěno onemocnění loketního kloubu – **Dysplazie loketního kloubu**

Podstata tohoto onemocnění spočívá v nesprávném vyvinutí loketního kloubu, nesprávném zapadání a pohybu hlavice pažní kosti v jamce loketního kloubu, což vede k bolestivosti loketního kloubu, odlomení vnitřního (tzv. korunkového) výběžku v lokti, zhoršení a omezení pohyblivosti a postupným rozvoji artrotických změn v loketním kloubu.

Rozvoj tohoto onemocnění je podmíněn plemenem, věkem, výživou, výživným stavem, hmotností a fyzickou aktivitou Vašeho pejska.

*Jak se **Dysplazie loketního kloubu** projevuje?*

- 1) kulhání a bolestivost na postiženou končetinu
- 2) odmítání pohybu a fyzické aktivity
- 3) potíže při vstávání
- 4) zhoršená pohyblivost, především zrána, během dne pak s postupným zlepšováním
- 5) odlehčování loketních kloubů, přenášení váhy těla a tím i přetěžování kyčlí
- 6) vtáčení loketních kloubů směrem k hrudníku

Pro zjištění míry postižení, rozvoje artrózy a s tím související stanovení prognózy vyléčení Vašeho pejska je nezbytně nutné provedení rentgenologické vyšetření loketního kloubu.

Vyšetření se provádí v mírné sedaci, nalačno.

Správná výživa je důležitá zejména proto, že psi s dysplazií loketního kloubu vyžadují dietu obohacenou zejména o vitamín E, L-karnitin a kvalitní bílkoviny + vysoký obsah nenasycených mastných kyselin ve správném poměru, které vyživují a regenerují kloubní chrupavky. (např. Hill's J/D)

Doplňky stravy - chondroprotektiva (Alavis, Nutradyl, Caniviton aj.) a jejich dávkování určí Vašemu pejskovi ošetřující lékař.

Zátěž by měla být pravidelná, vždy je třeba citlivě reagovat na potřebu odpočinku u Vašeho psa.

Pro zdárný průběh léčby jsou třeba pravidelné kontroly dle doporučení ošetřujícího lékaře. Na jejich základě může být Vašemu pejskovi upravena dávka nebo typ užívaných preparátů.

*Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme osobně nebo na telefonu 547 210 914,
nebo na e-mailové adrese: ordinace@veterinabrno.cz*